

กำหนดการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์การแพทย์

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาการเปลี่ยน
1.	สาย O <sub>2</sub> canular	7 วัน / เมื่อเปลี่ยนสกปรก
2.	O <sub>2</sub> T-piece + ครอบป้องกัน	1 วัน
3.	O <sub>2</sub> Collar mask	1 วัน
4.	O <sub>2</sub> mask c bag	1 วัน
5.	O <sub>2</sub> mask c collugate + ครอบป้องกัน	1 วัน
6.	O <sub>2</sub> Tent	เมื่อผู้ป่วย D/C (เช็ดทุกวันด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจานเช็ดตามด้วยน้ำสะอาด)
7.	ครอบป้องกัน O <sub>2</sub>	7 วัน
8.	สายเครื่องช่วยหายใจ	7 วัน / เมื่อเปลี่ยนสกปรก
9.	ครอบป้องกัน Nebulizer เครื่องช่วยหายใจ	7 วัน / เมื่อเปลี่ยนสกปรก เปลี่ยนน้ำกลั่นทุก 8 ชม.
10.	Set พ่นยา	1 วัน
11.	Mouth gag	1 วัน
12.	ขวดน้ำล้างสาย suction	1 วัน
13.	ขวดรองรับเสมหะ	ทุก 8 ชม.
14.	Receptal bag	เมื่อมี secretion ≈ 3 / 4 ครอบป้องกัน
15.	สายดูดเสมหะ (closed suction)	7 วัน
16.	Set ท่อด้วยผ้า sterile	14 วัน
17.	Set ท่อด้วยผ้า sterile ใส่ถุงพลาสติก	3 เดือน
18.	อุปกรณ์ใส่ช่อง Paper / plastic	6 เดือน (EO. ชมพู→เหลือง/ <u>ไอน้ำ</u> ฟ้า→เทา/ Sterrad น้ำตาล→เหลือง)
19.	กระปุกสำลี	1 วัน
20.	กระปุก Forcep	ทุก 8 ชม.
21.	70%Alcohol	7 วัน หลังเปิดใช้ (กรณียังไม่เปิดใช้ วัน EXP.ตามที่ระบุไว้ที่ขวด)
22.	10% Povidine solution	7 วัน หลังเปิดใช้ (กรณียังไม่เปิดใช้ วัน EXP.ตามที่ระบุไว้ที่ขวด)
23.	2%CHG in 70%Alcohol	7 วัน หลังเปิดใช้ (กรณียังไม่เปิดใช้ วัน EXP.ตามที่ระบุไว้ที่ขวด)
24.	2%Lidocaine	7 วัน หลังเปิดใช้ (กรณียังไม่เปิดใช้ วัน EXP.ตามที่ระบุไว้ที่ขวด)
25.	Sterile water	1 วัน หลังเปิดใช้ (กรณียังไม่เปิดใช้ วัน EXP.ตามที่ระบุไว้ที่ขวด)
26.	0.9%NSS	1 วัน หลังเปิดใช้ (กรณียังไม่เปิดใช้ วัน EXP.ตามที่ระบุไว้ที่ขวด)
27.	Heparin 1:100	1 วัน หลังเปิดใช้ (กรณียังไม่เปิดใช้ วัน EXP.ตามที่ระบุไว้ที่ขวด)
28.	น้ำยาล้างมือแห้ง	ทุกวันจันทร์
29.	ยาหยอดตา	1 เดือน
30.	อินซูลิน	1 เดือน
31.	MDI พ่นยา	เมื่อใช้หมด (แยกใช้กับผู้ป่วยแต่ละราย)
Set IV เปลี่ยนทุก 96 ชม.		Set IV drip ยาต่อ T-Way เปลี่ยนทุก 96 ชม.
Set IV drip ยาต่อ Heparin lock เปลี่ยนทุก 24 ชม.		Set TPN เปลี่ยนทุก 24 ชม./ เมื่อหมดขวด

หมายเหตุ อุปกรณ์ รายการที่ 1 – 15 เมื่อเปลี่ยนผู้ป่วย ให้เปลี่ยนทันที